

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	Periodo carenza
Vite	Peronospora. Azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario	200 - 300		Intervenire preventivamente. Nel caso di elevata pressione infettiva o condizioni atmosferiche particolarmente piovose, può essere utile innalzare la dose fino a 400 g/hl.	20 gg.
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Clementine, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Limetta, Chinotto, Tangerino)	Antracnosi, Cancro gommoso, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi. Azione collaterale su Fumaggine	350 - 450		Intervenire 1-4 volte quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.	20 gg.
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno)	Ticchiolatura, Monilia, Batteriosi, Septoriosi del Pero	510-610	max 9,28	Trattamenti autunno-invernali (2-3 trattamenti dopo la caduta foglie e in pre-fioritura).	Trattamenti fino a inizio fioritura
	Nectria	220-250	max 9,28	Trattamenti autunno-invernali.	
	Ticchiolatura, Monilia, Septoriosi del pero, Batteriosi, Nectria	250-350		Trattamenti primaverili.	
	Marciume del colletto	700-800		Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
	Colpo di fuoco batterico (melo e pero)	250-350		Trattamenti primaverili ed autunnali.	

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	Periodo carenza
Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino), Mandorlo	Bolla, Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee, Batteriosi	700-900		Trattamenti autunno-invernali (1-3 trattamenti).	solo trattamenti invernali
	Marciume del colletto	600-700		Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
Fragola	Vaiolatura, Marciume del colletto, Batteriosi	350-400		Trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa (2-4 trattamenti).	3 gg.
Olivo	Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Occhio di pavone	450		Intervenire nei periodi più favorevoli alle malattie (1-4 trattamenti).	20 gg.
Actinidia	Marciume del colletto	700-800		Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	20 gg.
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno, Pistacchio e altri fruttiferi a guscio), Fichi, Melograni, Cachi	Cancri rameali, Antracnosi, Batteriosi	600		Trattamenti autunno-invernali.	20 gg.
		450-550		Trattamenti primaverili-estivi.	
Pomodoro	Peronospora	200 -300	1,2-2,4	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (piogge, bagnatura, elevata umidità) e ripetendoli preferibilmente ogni 7-8 giorni. In caso di grave rischio elevare la dose a 400 g/hl.	3 gg.
	Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	350-400		Intervenire alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).	
Melanzana	Antracnosi, Moria delle piantine. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	350-400		Intervenire alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).	3 gg.
Aglione, Cipolla, Cipolline, Scalogno	Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici	350-400		Intervenire alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).	3 gg.
Melone, Zucchini, Cetriolo, Cetriolino	Maculatura angolare, Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico	350-400	Melone: max 3,1	Intervenire alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).	3 gg.
Cavoli	Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	350-400		Intervenire alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).	20 gg.
Carciofo, Cardo	Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico	350-400		Intervenire alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).	20 gg.
Finocchio**, Sedano**, Prezzemolo*	Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano. Azione collaterale su Marciume molle batterico.	350-400		Intervenire alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).	*= 7 gg. **= 20 gg.
Oleaginose	Peronospora, Antracnosi	-	3,5-4	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.	20 gg.
Patata	Peronospora, Marciume molle, Alternariosi delle solanacee	-	3,5-4	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeterli secondo necessità (mediamente 3-5 trattamenti).	7 gg.
Barbabietola da zucchero	Cercospora, Peronospora, Ruggine	-	3,5-4	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeterli secondo necessità (mediamente 2-3 trattamenti ogni 20 gg.).	20 gg.
Tabacco	Batteriosi (<i>Pseudomonas tabaci</i>), Antracnosi, Peronospora	-	3,5-4	Intervenire in semenzaio ed al trapianto effettuando 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni.	20 gg.
Floreali, Ornamentali	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi	450		Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeterli secondo necessità (mediamente 2-6 trattamenti ogni 7-10 gg.).	-
Cipresso	Cancro del cipresso	900-1400		Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripeterli secondo necessità (3 trattamenti ogni 25-30 gg. in primavera e 1-2 trattamenti in autunno).	-