

# AKTOR TRIPLO BLU

**FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO, AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA, PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE, DEL POMODORO E DEL TABACCO IN POLVERE BAGNABILE**

AKTOR TRIPLO BLU

PERICOLO

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:

Fosetil Alluminio puro g 32,5  
 Cimoxanil puro g 2,5  
 Mancozeb puro g 25  
 Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di prudenza**

P261 Evitare di respirare la polvere - P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

Titolare della registrazione:

HELM AG - Nordkanalstrasse 28

D-20097 Hamburg (Germania) - Tel.: 0049 40 2375 0

Distribuito da:

UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni 275-S. CARLO DI CESENA (FC)

**Officine di produzione:**

SCAM S.p.A. - S. Maria di Mugnano (MO) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

**Officine di confezionamento:** KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE) - Isola Vicentina (VI)**Registrazione del Ministero della Salute n° 12471 del 2/02/2005**

Contenuto netto: g 50-100-200-500-kg 1-5-10

Partita n° .....



**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO - Sintomi: == CIMOXANIL - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: ==

**CARATTERISTICHE**

AKTOR TRIPLO BLU è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. AKTOR TRIPLO BLU possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. AKTOR TRIPLO BLU è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di andamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.

**COMPATIBILITÀ:** il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.





**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta delle uve, 30 giorni prima della raccolta del tabacco e 20 giorni prima della raccolta dei pomodori

**ATTENZIONE**

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta in formato ridotto per le taglie da g 50 e 100**AKTOR TRIPLO BLU**

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO, AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA, PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE, DEL POMODORO E DEL TABACCO IN POLVERE BAGNABILE

AKTOR TRIPLO BLU	PERICOLO								
<p>COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:</p> <table border="0"> <tr><td>Fosetil Alluminio puro</td><td>g 32,5</td></tr> <tr><td>Cimoxanil puro</td><td>g 2,5</td></tr> <tr><td>Mancozeb puro</td><td>g 25</td></tr> <tr><td>Coformulanti q.b. a</td><td>g 100</td></tr> </table>	Fosetil Alluminio puro	g 32,5	Cimoxanil puro	g 2,5	Mancozeb puro	g 25	Coformulanti q.b. a	g 100	 
Fosetil Alluminio puro	g 32,5								
Cimoxanil puro	g 2,5								
Mancozeb puro	g 25								
Coformulanti q.b. a	g 100								
<p>Indicazioni di pericolo            H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari.            H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p>	 								
<p><b>Consigli di prudenza</b>            P261 Evitare di respirare la polvere - P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso - P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P310 – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico</p>									
<p><b>Titolare della registrazione:</b>  <b>HELM AG</b> - Nordkanalstrasse 28            D-20097 Hamburg (Germania) - Tel.: 0049 40 2375 0  <b>Distribuito da:</b>            UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni 275-S. CARLO DI CESENA (FC)</p>									
<p><b>Officine di produzione:</b>            SCAM S.p.A. - S. Maria di Mugnano (MO) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)  <b>Officine di confezionamento:</b> LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE) - Isola Vicentina (VI)</p>									
<p><b>Registrazione del Ministero della Salute n° 12471 del 2/02/2005</b></p>									
<p>Contenuto netto: g 50-100</p>	<p>Partita n° .....</p>								
<p><b>PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO            IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO            IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE</b></p>									