

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BORDOFLOW® NEW

Anticrittogamico a base di rame
Sospensione concentrata

BORDOFLOW NEW Registrazione Ministero della Salute n. 14102 del 29/05/2008

COMPOSIZIONE (rifinita a 100 g di prodotto)
RAMME metalliche g. 10 (= 124 g/L)
sotto forma di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio
Coformulanti g. b. a g. 100

MANICA SPA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:

Manica SPA Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Contenuto: 100-250-500-600-750-800 ml 1-2-3-4-5-6-7-10-20 L

Partita n

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PREVENZIONE: P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.

REAZIONE: P391 Raccogliere la fuoriuscita.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 491 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESERZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: dermatizzazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastroelisi con soluzione lattico-albuminosa; se cupremia elevata usare chelanti; periclitamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

BORDOFLOW NEW è un fungicida in sospensione liquida a base di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio, ad azione preventiva e d'atto di una notevole efficacia, persistenza, adesività e resistenza al dilavamento. L'alto grado di micronizzazione assicura un'omogenea ed uniforme copertura della vegetazione trattata.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Diluire direttamente in acqua la dose prescritta. In caso di impiego diirroratrici a basso volume, le dosi prescritte vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

VITE, contro Peronospora, con azione colaterale contro Escoriosi, Black-rot e Muffa grigia (*Botrytis*), prima della fioritura alla dose di 400-600 ml/ha, dopo la fioritura 500-800 ml/ha. Applicare il prodotto secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente dalla fioritura alla chiusura dei trattamenti.

POMACEE (MELO, PERO): contro Tichiodatura, Cancro rammei, *Ermisia amylovora* (Colpo di fuoco batterico), Maculatura bruna (*Alternaria*), Monilia e Septoriosi del pero, nei trattamenti eradicanti dalla caduta delle foglie (autunno-inverno) 1600 ml/ha, da ingrossamento gemme ad inizio caduta foglie contro *Ermisia*, Tichiodatura, 800 ml/ha.



ATTENZIONE

DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO: contro Bolla, Corineo (Gommosi), Muffe (Monilia), Cancro rammei, limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno 1900 ml/ha.

ACTINIDIA: contro marciume del colletto 1300 ml/ha (irrorare 10-15 litri di soluzione sulla parte basale del fusto); contro Batteriosi 800 ml/ha alla caduta delle foglie

NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO: contro Cancro del legno effettuare trattamenti distanziati di 15 giorni 800-1000 ml/ha.

NOCE: contro Batteriosi, Antracnosi, Cancro del legno con interventi a partire dalla pre-fioritura alla dose di 800-1000 ml/ha.

OLIVO: contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini con trattamenti alla ripresa vegetativa ed all'invasatura dei frutti 750-1250 ml/ha.

AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMELO, LIMETTA, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro Mal secco Allungatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto, a fine inverno-inizio primavera ed in autunno (all'invasatura dei frutti) 450-550 ml/ha.

FRAGOLA contro Valcoltura rossa, Cancro, Antracnosi 800 ml/ha.

PATATA, CAVOLI, CARCIOFO, ASPARAGO (limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni), **SEDANO, ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE** (lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, ecc.), **ORTAGGI A FRUTTO** (pomodoro, melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero), **FAGIOL, PISELLO, ORTAGGI A RADICE** (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsiccia, rutabaga, cicoria da radice, ecc.), **ORTAGGI A BULBO** (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.); contro

Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Antracnosi, Ruggini 800 ml/ha.

TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo); contro Peronospora 8-12 litra.

FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.); contro Peronospora, Ruggini, Tichiodatura, Antracnosi, Septoriosi, Cancro 800 ml/ha.

PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI (conifere, cipresso, oleandro, ecc.); contro Cancro, Necrosi, Corineo (in primavera ed in autunno) 800-1500 ml/ha.

BORDOFLOW NEW va impiegato seguendo i normali calendari di lotta a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori riducendo l'intervallo di tempo fra un trattamento e l'altro).

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con gli zolfi bagnabili e colloidali.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili; il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne consiglia l'impiego in piena vegetazione.

(*) Abbonanza Balfort, Black Stayman, Golden delicious, Graevenstien, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winnesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

(**) Abate Fetei, Buona Luglia D'Avanches, Butira Clargeau, Passerassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Ciapp, Kaiser, Butira Giffardi.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima del raccolto per fragola, patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, cucurbitacee; 7 giorni per ortaggi a foglia ed erbe fresche; 40 giorni per le pomacee (melo, pero); 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDESI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29.05.2008



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BORDOFLOW® NEW

Anticrittogamico a base di rame
Sospensione concentrata

BORDOFLOW NEW Registrazione Ministero della Salute n. 14102 del 29.05.2008

COMPOSIZIONE (rifretta a 100 g di prodotto)

RAMME metallico g. 10 (= 124 g/L)

sotto forma di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio

Coformulanti q. b. a g. 100


MANICA SPA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:

Manica SPA Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)



ATTENZIONE

Contenuto: 100 ml

Partita n

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.

REAZIONE: P391 Raccolgere la fuoriuscita.

CONSERVAZIONE: P403 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,

seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

ETICHETTA TRATTA DA FITOGEST.COM



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29.05.2008



Etichetta tratta da www.fitogest.com®

