

| COLTURA | DOSE | MODALITÀ APPLICATIVE |
|---|-------------|---|
| Pomacee | 1-1,35 l/ha | Pre-emergenza delle infestanti: contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Post-emergenza delle infestanti: vedere etichetta per gli specifici casi. |
| Drupacee | | |
| Arancio | | |
| Limone | | |
| Pompelmo | | |
| Vite | | |
| Nocciolo | | |
| Mandorlo | | |
| Olivo | 1-1,35 l/ha | Intervenire fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo lo sfalcio. Solo in caso di forte infestazione la dose può essere elevata a 1,5 lt/ha di superficie effettivamente trattata. |
| Girasole | 0,5 l/ha | Impiegare su colture seminate ad almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Impiegare HEREU SC® in pre-emergenza della coltura. |
| Carciofo | 0,5-1 l/ha | Il prodotto deve essere impiegato lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza. In pre-emergenza della coltura 0,5-0,75 lt/ha; in post-emergenza della coltura 0,75-1 lt/ha di superficie effettivamente trattata. |
| Vivai di forestali e ornamentali | 1-1,75 l/ha | Intervenire prima dell'emergenza delle infestanti annuali. Con specie resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, prima delle emissioni dei nuovi germogli. |
| Incolti, argini | 2-2,5 l/ha | In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla dose di 0,5 - 1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata. |
| Sedi ferroviarie | | |