

Colture (intervallo di sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Melo, Pero (14 giorni)	Acari	20 ml/hl	<p>È possibile effettuare il trattamento in diversi momenti e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con bassa popolazione di forme mobili: si interviene alla dose di 20 ml/hl; - con elevata popolazione di forme giovanili e adulte: si interviene alla dose di 20 ml/hl associando un acaricida adulticida.
Pesco (14 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro) (14 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Vite (14 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Actinidia (14 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Fragola (7 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Cucurbitacee (melone, cetriolo) (7 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Solanacee (peperone, melanzana, pomodoro) (7 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Fagiolino (7 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Soia (34 giorni)	Acari	20 ml/hl	
Floreali, ornamentali	Acari	20 ml/hl	