

# FINY®

Diserbante di post emergenza per colture di frumento, orzo, avena, triticale -  
Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

## COMPOSIZIONE

Metsulfuron metile puro	g.	20
Coformulanti	q.b. a g.	100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P273. Non disperdere nell'ambiente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente.

**UPL Europe Ltd.**

The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999

Officina di produzione: **UPL Europe Ltd. Sandbach**, Cheshire – CW113QQ – Gran Bretagna; **CEREXAGRI BV** - Rotterdam (Olanda)

Distributori:

**UPL Italia** - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC

**Agrimix** - Via Campobello 1 - 00040 Pomezia RM

Registrazione n. 14134 del 31/07/2009 del Ministero della Salute

Quantità Netta del preparato: 10, 15, 20, 30, 60, 100 g

PARTITA N°: .....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleeni.

## CARATTERISTICHE

**FINY** è un erbicida di post-emergenza per il frumento duro, frumento tenero, orzo, avena e triticale a bassa dose d'impiego. Controlla la maggior parte delle infestanti a foglia larga, sia quelle più comuni (es. papavero, stellaria, senape, ecc.) sia quelle resistenti agli ormonici (es. miagro camomilla, stoppione, crisantemo ecc.). Dotato di un ampio periodo d'impiego (da inizio accestimento a botticella) è particolarmente indicato per interventi primaverili precoci.

Erbe infestanti sensibili: Stellaria (*Stellaria media*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Viola tricolore (*Viola tricolor*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Veronica (*Veronica persica*), Stoppioni (*Cirsium spp.*), Romici (*Rumex spp.*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*).

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**FINY** o si impiega nel diserbo di post-emergenza di frumento duro, tenero, orzo, avena e triticale alla dose di 30 grammi per ettaro in 300-400 l/ha di acqua. Il prodotto può essere impiegato da inizio accestimento a botticella, ma i migliori risultati si ottengono in interventi primaverili precoci. Trattare con infestanti giovani (stadio di plantula) e in fase di attiva crescita.

**Preparazione della miscela:** Versare il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice mantenuto in costante agitazione. In caso di miscela, aggiungere l'altro o gli altri prodotti dopo che il prodotto si è già completamente disciolto. Il bagnante va aggiunto per ultimo alla miscela.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto non è miscibile con formulati contenenti tralkossidim e con fertilizzanti, mentre è compatibile con altri avenicidi. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Dopo l'applicazione non effettuare la trasemina di leguminose foraggere. Non trattare su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali o attacchi parassitari. Non trattare su terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o soggetti a inondazioni. In caso di fallimento della coltura seminare grano od orzo dopo un'aratura profonda. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni. Dopo un trattamento con il prodotto si possono seminare, previa aratura, le seguenti colture: Centro e Sud Italia: tutte le colture nell'annata successiva ad eccezione della bietola; Italia Settentrionale: soia o mais di secondo raccolto. È importante effettuare un lavaggio accurato delle attrezzature prima e dopo l'applicazione. Se disponibile, utilizzare l'attrezzatura solamente per il diserbo.

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non applicare in terreni situati in aree di riconosciuta vulnerabilità al percolamento (ai sensi del DLgs 152/2006).

DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

**FINY<sup>®</sup>**

**Diserbante di post emergenza per colture di frumento, orzo, avena, triticale -  
Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili**

**COMPOSIZIONE**

Metsulfuron metile puro	g.	20
Coformulanti	q.b. a g.	100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**

H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

P273. Non disperdere nell'ambiente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente.

**UPL Europe Ltd.**

The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999

Officina di produzione : **UPL Europe Ltd. Sandbach**, Cheshire – CW113QQ – Gran Bretagna; **CEREXAGRI BV** - Rotterdam (Olanda)

Distributori:

**UPL Italia S.r.l.**- Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC - Tel 0547 661523,

**Agrimix** - Via Campobello 1 - 00040 Pomezia RM

Registrazione n. 14134 del 31/07/2009 del Ministero della Salute

Quantità Netta del preparato: 10, 15, 20, 30, 60, 100 g

PARTITA N°: .....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveneni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**