

PENDIGAN

Autorizzazione del Ministero della Salute n.
8646 del 31.01.1995

Composizione

Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 – Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene Pendimetalin. Può provocare reazione allergica.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 – Proteggere il viso. P302+P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG).

Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

ADAMA AGAN Ltd. - P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele
I.R.C.A. Service SpA - 54040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SCAM S.r.l. - 41010 S. Maria di Mugnano (MO)
PRO.PHY.M Sarl - 73130 Le Chambres (Francia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - 20078 S. Colombano Al Lambro (MI)
SCHIRM AG Division Hermania - Schoenbeck (Germania)
KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE).
SIPCAM Spa - Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:

CHEMARK Kft. - 8182 Peremarton- Ungheria

Distribuito da:

Du Pont de Nemours Italiana srl, Via Pontaccio 10, Milano
COMPO Italia Srl - Cesano Maderno (MB)
Green Ravenna Srl - Ravenna
S.I.V.A.M. S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)
AGRICO srl - Bologna (BO)
NUFARM ITALIA S.r.l. - Viale Luigi Majno 17/A - 20122 Milano (MI)
Litri 0,2-0,25-0,5-1-1,5-5-10-15-20 Partita n.....



PERICOLO

PENDIGAN

LIQUIDO EMULSIONABILE

Diserbante selettivo per cereali, orticole, tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto di 5 m.

INFORMAZIONI MEDICHE SINTOMI: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.

TERAPIA: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE: PENDIGAN è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata, pisello, tabacco, soia, tappeti erbosi. È efficace contro malerbe:

graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giovane comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Setaria viridis* (Falso panico), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Panicum dichotomiflorum* (Giovane americano).

A foglia larga: *Solanum nigrum* (Erba morella), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Amaranthus* spp., *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine*, (Attaccamani) *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Polygonum* spp., *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Stellaria* spp., *Papaver rhoeas* (Papavero).

Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1ª foglia per le graminacee.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 cm) senza avere semi scoperti in superficie.

Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12).

Carciofo: 4,5 l/ha in pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). **Carota:** 4 l/ha in pre-emergenza. **Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles):** 2,75 l/ha solo in pre-trapianto.

Cipolla: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). **Favino:** 3,6 l/ha in pre-emergenza. **Finocchio:** 3,6 l/ha in pre-emergenza (non usare su

terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-trapianto. **Girasole:** 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Frumento, orzo, segale:** 4 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-13). **Mais:** 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-12). **Melanzana, Pomodoro, Peperone:** 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. **Patata:** 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Pisello:** 5,3 l/ha in pre-emergenza. **Fagiolo, fagiolino:** 3,6 l/ha in pre-emergenza. **Riso:** (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. **Soia:** 3 l/ha in pre-semina (incorporato) o pre-emergenza. **Tabacco:** 5,3 l/ha in pre-trapianto. **Pioppo:** 4,5 l/ha in post-trapianto. **Ornamentali** (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto

In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione. **Tappeti erbosi:** il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca* spp. e *Agrostis stolonifera* (quest'ultima purché mantenuta ad un'altezza di taglio superiore a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza organica) in un'unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.

Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- 500 l/ha. **AVVERTENZA:** Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI. PRIMA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE DI ORZO, MAIS SEGALE FRUMENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**