

APPLAUD® PLUS

INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA IN FORMULAZIONE POLVERE BAGNABILE PER IL CONTROLLO DI VARIE SPECIE DI COCCINIGLIE E ALEURODIDI SU COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI.

- APPLAUD PLUS - Composizione:
- Buprofezin puro g. 25 (pari a 250 g/Kg)
- Coformulanti ed inerti: q.b. a g. 100



INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391).

© marchio registrato Nihon Nohyaku Co. Ltd - Tokyo Japan

SIPCAM ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15333 del 10.05.2012

Distribuito da:

Ital-Agro S.r.l. - Via Vittorio Veneto,81 – Salerano sul Lambro (LO)

Officine di produzione:

SIPCAM S.p.A.: Salerano sul Lambro (Lodi)

Nichino Service Co. Ltd: Saga Plant 180-1, Oaza Tsutsumi Aza Nihonsugi

Kamimine-cho, Miyaki-gun Saga 849-0124 - Japan

Officine di confezionamento:

Kollant S.r.l. – Via C. Colombo 7/7A, 30030 Vigonovo (VE)

Sinapak S.r.l. - Via dell'Industria e Artigianato 7, 27049 Stradella (PV)

Taglie: 1,5 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 g

1 - 2 - 5 - 10 - 20 Kg

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 20 m da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva (50% di riduzione) ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: (rilevati in animali da esperimento) disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione.

Terapia: non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto.

Controindicazioni:

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida regolatore di crescita che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, dotato di parziale attività citotropica blocca la crescita delle specie sensibili negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre una azione sterilizzante sulle femmine.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, calcolate per interventi con irroratrici a volume normale.

Colture	Dose g/hL	Dose Kg/Ha	Modalità di impiego Contro:
Colture floreali e Ornamentali	150-200	1,5-2	Cocciniglie forma giovanili in migrazione. Aleurodidi.

COMPATIBILITÀ

Usare cautela in caso di miscelazione con sostanze alcaline, quali poltiglia bordolese e calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Non utilizzare in fioritura.

APPLAUD® PLUS

INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA IN FORMULAZIONE POLVERE
BAGNABILE PER IL CONTROLLO DI VARIE SPECIE DI COCCINIGLIE E
ALEURODIDI SU COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI

- APPLAUD PLUS - Composizione:
- Buprofezin puro g. 25 (pari a 250 g/Kg)
- Coformulanti ed inerti: q.b. a g. 100



INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391).

® marchio registrato Nihon Nohyaku Co. Ltd - Tokyo Japan

SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. 15333 del 10.05.2012

Distribuito da:

Ital-Agro S.r.l. - Via Vittorio Veneto,81 – Salerano sul Lambro (LO)

Officine di produzione:

SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Nichino Service Co. Ltd - Saga Plant 180-1, Oaza Tsutsumi Aza Nihonsugi
Kamimine-cho, Miyaki-gun Saga 849-0124 - Japan

Officine di confezionamento:

Kollant S.r.l. – Via C. Colombo 7/7A, 30030 Vigonovo (VE)
Sinapak S.r.l. - Via dell'Industria e Artigianato 7, 27049 Stradella (PV)
Taglie: 1,5 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 g
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 20 m da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva (50% di riduzione) ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: (rilevati in animali da esperimento) disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione.

Terapia: non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto.

Controindicazioni: -----

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleeni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**