

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Note	Periodo carenza
Vite	Peronospora. Azione collaterale su: Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario	200-300	Intervenire preventivamente. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 400 g/hl.	20 gg.
Agrumi	Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto. Azione collaterale su: Batteriosi.	250-300	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.	20 gg.
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno)	Ticchiolatura, Monilia, Nectria, Batteriosi, Septoriosi del Pero	450	Trattamenti autunno-invernali.	Trattamenti fino a inizio fioritura
		200-250	Trattamenti primaverili.	
	Marciume del colletto	400-450	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
Pero	Colpo di Fuoco batterico	200-250	Trattamenti primaverili e autunnali.	Trattamenti fino a inizio fioritura
Mandarlo	Corineo, Monilia, Bolla, Cancro delle Drupacee. Azione collaterale su: Batteriosi	500-600	Trattamenti invernali.	20 gg.
Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino)	Corineo, Monilia, Bolla, Cancro delle Drupacee. Azione collaterale su: Batteriosi.	500-600	Trattamenti invernali.	Solo trattamenti invernali
	Marciume del colletto del ciliegio	400-500	Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	
Fragola	Vaiolatura, Marciume del colletto	200-300	Intervenire alla ripresa vegetativa.	3 gg.
Olivo	Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Occhio di pavone	250-350	Intervenire nei periodi più favorevoli alle malattie.	20 gg.

Culture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	Periodo carenza
Actinidia	Marciume del colletto	400-500		Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.	20 gg.
Fruttiferi a guscio	Cancri rameali	450		Trattamenti autunno-invernali.	20 gg.
		200-250		Trattamenti primaverili-estivi.	
Aglione, Cipolla, Cipolline, Scalogno	Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	3 gg.
Pomodoro	Cladosporiosi, Violtatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	3 gg.
Melanzana	Antracnosi, Moria delle piantine. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni	3 gg.
Melone, Cocomero, Zucca, Zucchini, Cetriolo, Cetriolino	Maculatura angolare, Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico	250-350	Melone, Cocomero, Zucca: max 2,3	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	3 gg.
Cavoli	Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Asparago	Ruggine. Azione collaterale su: Muffa grigia	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni. Limitare i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni.	-
Carciofo, Cardo	Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Finocchio, Sedano, Prezzemolo	Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano. Azione collaterale su: Marciume molle batterico	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Ortaggi a foglia ed erbe fresche, Legumi	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi	250-350		Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.	20 gg.
Oleaginose	Peronospora, Antracnosi	-	2,5-3	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.	20 gg.
Patata	Peronospora, Alternariosi	-	2,5-2,7	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	7 gg.
Barbabietola da zucchero	Cercospora. Azione collaterale su: Peronospora, Ruggine	-	2,5-3	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	20 gg.
Tabacco	Peronospora	-	2,5-3	Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	20 gg.
Floreali, Ornamentali	Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Ticchilatura, Batteriosi (azione collaterale)	250-350		Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.	-
Cipresso	Cancro del cipresso	800-1000		Trattamenti preventivi in primavera e autunno.	-