

| Colture | Avversità | Dosi (ml/hl) | Note | Periodo carenza |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------|
| Vite | Oidio | 25-30 | Ogni 14-16 gg. in pre e post-fi oritura. | 14 gg. |
| | | 15-20 | Ogni 7-10 gg. in pre e post-fi oritura. | |
| | | 50 | Con attacchi in atto effettuare 2 trattamenti, ogni 5-7 gg. Poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Attività collaterale contro <i>Guignardia spp.</i> e, in minor misura, <i>Pseudopeziza spp.</i> | |
| Melo | Ticchiolatura | 30-40 | Preventivi: ogni 6-8 gg. fi no a frutto noce, poi ogni 10-15 g. g. | 14 gg. |
| | | 40-50 | Curativi: entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante. | |
| | | 40-45 | Bloccanti*: 2 applicazioni ogni 5-7 giorni. | |
| | Oidio | 30-40 | Preventivi: in primavera ogni 10 gg., in estate ogni 10-14 gg. | |
| | | 30-35 | Bloccanti: 3-4 applicazioni, ogni 7 giorni. | |
| | Malattie da conservazione | 40-45 | Pre-raccolta: 2-3 applicazioni, ogni 7 giorni. | |
| Pero | Ticchiolatura | 25-35 | Preventivi: ogni 10-12 gg. | 14 gg. |
| | | 30-40 | Curativi: entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante. | |
| | | 30-40 | Bloccanti*: 2 applicazioni ogni 5-7 giorni. | |
| Pesco | Oidio | 40-50 | Preventivi: da caduta petali ogni 10-14 gg. (in zone di minor rischio ogni 14-21 gg.). | 14 gg. |
| | Malattie da conservazione | 50 | In pre-raccolta: 2-3 applicazioni ogni settimana. | |
| Melone, Zucchini, Zucca, Cetriolo, Carciofo, Pisello, Peperone (solo pieno campo), Pomodoro (solo pieno campo) | Oidio | 25-50 | In pieno campo, o dopo la rimozione del telo di protezione, intervenire preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi. 2-4 applicazioni, ogni 12-14 gg., secondo la coltura ed il rischio di infezione. | 14 gg. |
| Tabacco | Oidio | 35-50 | Da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni. | 14 gg. |
| Ornamentali, Fiori | Oidio, Ruggini | 25-50 | Ogni 10-14 gg., a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. | 14 gg. |

* Negli interventi bloccanti (in presenza di sintomi) è consigliabile l'aggiunta di un prodotto di copertura.