

# NEMATHORIN 10 G

(GRANULARE FINE)

Nematocida per contatto per patata e pomodoro

NEMATHORIN 10 G Registrazione Ministero della Sanità N. 10324 del 08/02/2000

Composizione:  
FOSTHIAZATE puro g 10  
Coformulanti q.b.a g 100

**ISK**

**ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.**

Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9

B-1831 Diegem (Belgio)

Tel. 0032-2-6278611

distribuito da

**Syngenta Italia S.p.A**

Via Gallarate, 139 - 20151 Milano

Tel. +39 02 334441

Stabilimento di produzione:

**ARYSTA S.A.** - Nogueres (Francia)



**PERICOLO**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H301 Tossico se ingerito. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

**REAZIONE:** P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321 Trattamento specifico (vedere le informazioni per il medico su questa etichetta). P330 Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** P401 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P405 Conservare sotto chiave.

**SMALTIMENTO:** P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Partita n° .... Contenuto **4-5-10-15-25 Kg**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli uccelli e tossica per gli organismi acquatici, la fauna selvatica e le api.

Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno. Ricoprire eventuali fuoriuscite di prodotto.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Non usare su terreni situati in aree vulnerabili al percolamento.

Durante l'applicazione con attrezzature trainate o montate su trattore, usare indumenti protettivi adatti. Durante la manipolazione del prodotto, il caricamento, la pulizia delle attrezzature ed in caso di sversamenti accidentali usare indumenti protettivi e guanti adatti, un facciale filtrante con filtro combinato antipolvere ed antigas FFAP3 (EN 405); proteggersi gli occhi/la faccia.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche neuromuscolari.

**Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

**Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

**Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleli.

## CARATTERISTICHE

Il NEMATHORIN 10 G è un nematocida per contatto dotato di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi cistiformi (*Globodera rostochiensis*, *Globodera pallida*), galligeni (*Meloidogyne spp.*) e altri nematodi che attaccano le colture di patata e pomodoro.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo con attrezzature montate o trainate su trattore.

Il prodotto si applica una sola volta l'anno su terreno nudo.

La distribuzione del prodotto seguita dall'immediato incorporamento nel terreno (10-15 cm) può essere effettuata contemporaneamente al trapianto o alla semina o prima del trapianto o della semina per mezzo di idonei microgranulatori opportunamente tarati in modo da assicurarne la giusta ed uniforme distribuzione. In questo caso è consigliabile effettuare il trapianto entro le 24 ore.

N.B. L'incorporamento del prodotto nel terreno a profondità maggiori di 10-15 cm può ridurre l'efficacia.

## DOSI D'IMPIEGO

**Patata** contro nematodi cistiformi (*Globodera rostochiensis*, *Globodera pallida*) ed altri nematodi: **30 Kg/ha.**

**Pomodoro** (in pieno campo e in serra) contro nematodi galligeni (*Meloidogyne spp.*) ed altri nematodi: **30 Kg/ha.**

## COMPATIBILITÀ

Il prodotto si usa da solo.

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**CONSERVARE IL PRODOTTO AL RIPARO DALL'UMIDITÀ  
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE  
O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**